

















Bijlage 62bis

Parodontaal mondonderzoek 301372-301383 – Gestandaardiseerd verslag.

PATIENT : DOSSIERNR : DATUM :

				
FURC				
MOB				
REC				
TOETSLIJN				
RELATIE				
REC				
	8 7 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 7 8	
REC				
TOETSLIJN				
REC				
MOB				
FURC				
% BLOEDING				24
	8 7 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 7 8	
				%
% PLACUE				24
	8 7 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 7 8	
				%

DIAGNOSE :

BEHANDELPLANNING :

OPMERKINGEN :

HET GEBRUIK VAN EEN GELUKKWAARDIG MODEL DAT ALLE VERBODEN GEGEVENS BEVAT IS TOEGELATEN

Richtlijnen bij het invullen van het parodontaal mondonderzoek.

1. Plaquescore: in de rooster '% PLAQUE' kan per element op 4 locaties de aanwezigheid van plaque langs de gingivale rand worden genoteerd door een + in te vullen in het betreffende vakje. Men kan de plaquescore noteren van alle tanden of volgens het principe van de Ramfjord elementen 16 – 21 – 24 – 36 – 41 – 44 (zie de grijs ingekleurde vakken). *

De verhouding van het aantal positieve scores tov het totaal aantal tandvlakken geeft de procentuele plaquescore. Bij 6 aanwezige Ramfjord elementen is het maximum aantal tandvlakken 24, bij registratie van een volledige dentitie 128.

* de 6 Ramfjord elementen 16-21-24-36-41-44 vormen de basis voor een accurate weergave van de parodontale toestand van de gehele mond. Als 1 Ramfjord element ontbreekt, wordt de buurtand gescoord van dezelfde soort in hetzelfde sextant (bv.16 wordt 17, 21 wordt 11, 44 wordt 45). Streefdoel blijft om de 3 verschillende tandengroepen te scoren per kaak.

2. Pocketdiepte is de afstand in mm, gemeten van de marginale gingivarand tot de bodem van de pocket met een conisch verlopende, in doorsnede ronde pocketsonde op minstens 4 tand- of implantaatvlakken. Er wordt zoveel mogelijk richting apex gesondeerd en approximaal zo dicht mogelijk bij het contactpunt.

3. Recessie is de afstand in mm, van de glazuurcementgrens of de apikale rand van een vulling of restauratie tot de marginale gingivarand, gemeten met een pocketsonde. Bij een implantaat is de recessie de afstand van de rand van de suprastructuur tot de marginale gingivarand.

4. Pocketbloedingsneiging: 30 seconden na pocket sondering wordt gekeken of er bloeding is opgetreden. Een positieve score kan als volgt worden genoteerd: inkleuren met rood op de parodontale status thv de betreffende pocketwaarde of in de rooster '% BLOEDING' thv het betreffende tandvlak. De hele dentitie wordt overlopen en geregistreerd. De verhouding van het aantal positieve scores tov het totaal aantal tandvlakken geeft de procentuele pocketbloedingsneiging.

Niet te verwarren met het scoren van de sulcusbloedingsneiging (gingivitis index) waarbij niet op volledige pocketdiepte wordt gesondeerd, maar met de tip van de pocketsonde op 45° langsheen de binnenzijde van de sulcus wordt gewreven en ongeveer 20 seconden later de uitgebreidheid van de bloedingsreactie wordt genoteerd.


5. Mobiliteitstoename: wordt gemeten door met het heftuiteinde van 2 instrumenten (bv. pocket-sonde en mondspiegel) te tikken op 2 tegenoverstaande tandvlakken (bv buccaal en oraal). Er zijn 4 mogelijke scores:

- 0 → normale fysiologische beweeglijkheid
- 1 → mobiliteit horizontaal tot 1mm
- 2 → mobiliteit horizontaal tussen 1 en 2 mm
- 3 → mobiliteit horizontaal > 2 mm en /of verticale mobiliteit

6. Furcatiebetrokkenheid: wordt gediagnosticeerd met behulp van een furcatie-sonde, ook Nabers sonde genoemd. Een gradatie wordt toegekend op basis van hoe diep (in mm.) de sonde in de furcatie dringt. De scores worden genoteerd in cirkelvormige vakjes die niet de tandwortels voorstellen, maar de furcatie toegangen. We onderscheiden 4 mogelijke scores, genoteerd in Romeinse cijfers:

- 0 → geen furcatie voelbaar
- I → toegankelijkheid tot 3mm (minder dan 1/3 van de diameter van de tand).
- II → toegankelijkheid > 3mm (meer dan 1/3 van de diameter van de tand)
- III → doorgankelijkheid of open furcatie van V naar O, van M naar D, van V naar M of D

Opmerking:



In het centrale deel van elk tandvak kunnen bijzonderheden over het element worden vermeld met afkortingen of symbolen naar keuze

Diagnose en behandelplanning:

Specifiëren van het type en de uitgebreidheid van de parodontale aandoening.
Opstellen van het verdere behandelingsplan