



SONDAGE - PHARMACIENS

AVANT LA CONCERTATION

1. Selon vous, quelle est la proportion de vos patients concernés par chacune de ces problématiques ?

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
abus et/ou dépendance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Dans quelle mesure vous sentez-vous concerné par ces problématiques ?

		1	2	3	4	5	6	7	
abus et/ou dépendance	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné

3. Dans votre pratique, sur les trois dernières expériences dans le cadre de ces problématiques, comment évaluez-vous la collaboration entre pharmacien et médecin ?

	inexistante		1	2	3	4	5	6	7	
abus et/ou dépendance	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne

4. Qu'attendez-vous de cette concertation ?

Suite à cette rencontre, ...		1	2	3	4	5	6	7	
Je contacterai plus souvent/facilement le médecin	Pas du tout d'accord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Entièrement d'accord
Ma connaissance de la pratique du médecin et de ses compétences spécifiques sera améliorée	Pas du tout d'accord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Entièrement d'accord
Je travaillerai davantage selon l'Evidence Based Medicine (EBM)	Pas du tout d'accord	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Entièrement d'accord

6. Remarque(s)



SONDAGE - PHARMACIENS

3 MOIS APRES LA CONCERTATION

1. A la suite à la concertation, avez-vous constaté un impact dans votre pratique?

<input type="checkbox"/> OUI	Je contacte plus souvent/facilement le médecin	Pas du tout d'accord	1	2	3	4	5	6	7	Entièrement d'accord
	Ma connaissance de la pratique du médecin et de ses compétences spécifiques a été améliorée	Pas du tout d'accord								Entièrement d'accord
	Je travaille plus souvent d'après l'EBM	Pas du tout d'accord								Entièrement d'accord
	Autre(s) impact(s) constatés(s) :									
<input type="checkbox"/> NON	Pouvez-vous expliquer pourquoi ?									
<input type="checkbox"/> PAS D'AVIS	Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?									

2. Selon vous, quelle est la proportion de vos patients concernés par chacune de ces problématiques ?

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
abus et/ou dépendance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Dans quelle mesure vous sentez-vous concerné par ces problématiques ?

		1	2	3	4	5	6	7	
abus et/ou dépendance	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	Pas du tout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très concerné



4. Dans votre pratique, sur les trois dernières expériences dans le cadre de ces problématiques, comment évaluez-vous la collaboration entre pharmacien et médecin ?

	inexistante		1	2	3	4	5	6	7	
abus et/ou dépendance	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne
prise de traitement de benzodiazépines à long terme (> 2 semaines)	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne
prise de traitement de substitution (méthadone, ...)	<input type="radio"/>	Très mauvaise	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Très bonne

5. Remarque(s)