Diagramme de flux pour les professionnels des soins de santé de première ligne

en cas de suspicion de perte auditive chez l'adulte

RIZIV

Vos actions	Aucune action n'est requise
Constatations	Référer

Liste de contrôle
« Reconnaître une perte auditive »
Vos soupçons sont-ils confirmés ?

Vous pensez que votre patient souffre d'une perte auditive

Votre patient vous signale spontanément un perte auditive

Non

Oui

Discuter au sujet de la perte auditive et des conséquences négatives possibles d'une perte auditive non traitée

En cas de perte auditive brusque, aggravation rapide ou fluctuante de l'ouïe, uni- ou bilatérale, **une intervention rapide** est cruciale

Oui → **Référer d'urgence** au **médecin généraliste**

Non

Si la **discussion** révèle une perte auditive

Ou → Référer au **médecin généraliste**

ou

Ou

Ou d'après le résultat du dépistage auditif :

Score : > 70	**Autotest vocal dans le bruit « Höra »**	Score : ≤ 70
	ou	
Score : 0 - 8	**Le questionnaire de dépistage auditif pour adultes**	Score : 10 - 40

→ Référer au **spécialiste ORL ou à un audiologue / audicien** dans un centre auditif pour effectuer un test auditif

Pas besoin de référer