

II

HOOFDSTUK II

Vergoedingsvoorwaarden voor de vergoedbare specialiteiten zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer, met een controle achteraf

A.- Toepassingsmodaliteiten

Wanneer de voorschrijvende arts een specialiteit opgenomen in dit hoofdstuk voorschrijft voor een indicatie die terugbetaald wordt volgens de vergoedingsmodaliteiten zoals ze daarvoor uitgewerkt zijn in hoofdstuk IV van deze lijst, brengt hij op het voorschrift de vermelding "IV" aan. In dat geval wordt de betrokken specialiteit slechts vergoed mits voorlegging van een machtiging van de adviserend geneesheer.

B.- Lijst van de zonder voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer vergoedbare specialiteiten, met een controle achteraf

Paragraaf 10000

§ 10000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 20000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie B:

II

CHAPITRE II

Conditions de remboursement des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori

A.- Modalités d'application

Lorsque le médecin prescripteur prescrit une spécialité reprise dans ce chapitre pour une indication remboursée selon les modalités de remboursement telles qu'elles ont été élaborées à cet effet au chapitre IV de cette liste, il appose sur l'ordonnance la mention "IV". Dans ce cas, la spécialité concernée est remboursable qu'après la soumission d'une autorisation du médecin conseil.

B.- Liste des spécialités remboursables sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle a posteriori.

Paragraphe 10000

§ 10000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 20000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie B :

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| | | | | | | | | |

| ESOMEPRAZOLE AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2990-703 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 18,03 | 18,03 | 2,57 | 4,28 |
| | 2990-703 | | | | 9,68 | 9,68 | | |
| B-48 * | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1249 | 0,1249 | | |
| B-48 ** | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1026 | 0,1026 | | |
| B-48 *** | 7700-636 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1267 | 0,1267 | 0,0257 | 0,0428 |

| ESOMEPRAZOLE AB 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2990-729 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,64 | 12,64 | 1,47 | 2,46 |
| | 2990-729 | | | | 5,56 | 5,56 | | |
| B-48 * | 7700-644 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2564 | 0,2564 | | |
| B-48 ** | 7700-644 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2104 | 0,2104 | | |
| B-48 *** | 7700-644 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2597 | 0,2597 | 0,0525 | 0,0879 |

| ESOMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2894-236 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 15,79 | 15,79 | 2,12 | 3,53 |
| | 2894-236 | | | | 7,98 | 7,98 | | |
| B-48 | 2893-519 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 17,80 | 17,80 | 2,52 | 4,20 |
| | 2893-519 | | | | 9,51 | 9,51 | | |
| B-48 * | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1252 | 0,1252 | | |
| B-48 ** | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1029 | 0,1029 | | |
| B-48 *** | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1269 | 0,1269 | 0,0257 | 0,0429 |

| ESOMEPRAZOLE EG 40 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2893-527 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 12,97 | 12,97 | 1,54 | 2,57 |
| | 2893-527 | | | | 5,82 | 5,82 | | |
| B-48 * | 0755-256 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2682 | 0,2682 | | |
| B-48 ** | 0755-256 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2204 | 0,2204 | | |
| B-48 *** | 0755-256 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2718 | 0,2718 | 0,0550 | 0,0918 |

| ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 3494-234 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 15,72 | 15,72 | 2,10 | 3,50 |
| | 3494-234 | | | | 7,92 | 7,92 | | |
| B-48 | 2738-532 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 17,79 | 17,79 | 2,52 | 4,20 |
| | 2738-532 | | | | 9,50 | 9,50 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 * | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1251 | 0,1251 | | |
| B-48 ** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1028 | 0,1028 | | |
| B-48 *** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1268 | 0,1268 | 0,0257 | 0,0429 |

| ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2738-557 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 12,65 | 12,65 | 1,48 | 2,46 |
| | 2738-557 | | | | 5,57 | 5,57 | | |
| B-48 * | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2568 | 0,2568 | | |
| B-48 ** | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2107 | 0,2107 | | |
| B-48 *** | 0757-518 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2601 | 0,2601 | 0,0529 | 0,0879 |

| ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC05 | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2886-695 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 15,55 | 15,55 | 2,07 | 3,44 |
| | 2886-695 | | | | 7,79 | 7,79 | | |
| B-48 | 2889-905 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,27 | 19,27 | 2,82 | 4,70 |
| | 2889-905 | | | | 10,64 | 10,64 | | |
| B-48 * | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1373 | 0,1373 | | |
| B-48 ** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-48 *** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1391 | 0,1391 | 0,0282 | 0,0470 |

| ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2880-862 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 12,97 | 12,97 | 1,54 | 2,57 |
| | 2880-862 | | | | 5,82 | 5,82 | | |
| B-48 * | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2682 | 0,2682 | | |
| B-48 ** | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2204 | 0,2204 | | |
| B-48 *** | 0753-780 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2718 | 0,2718 | 0,0550 | 0,0918 |

| LANSOPRAZOL AB 15 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC03 | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2248-508 | 56 capsules, hard, 15 mg | 56 gélules, 15 mg | G | 14,64 | 14,64 | 1,88 | 3,13 |
| | 2248-508 | | | | 7,09 | 7,09 | | |
| B-48 * | 0781-872 | 1 capsule, hard, 15 mg | 1 gélule, 15 mg | G | 0,1634 | 0,1634 | | |
| B-48 ** | 0781-872 | 1 capsule, hard, 15 mg | 1 gélule, 15 mg | G | 0,1343 | 0,1343 | | |
| B-48 *** | 0781-872 | 1 capsule, hard, 15 mg | 1 gélule, 15 mg | G | 0,1656 | 0,1656 | 0,0336 | 0,0559 |

| LANSOPRAZOL AB 30 mg | | AUROBINDO NV | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC03 | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| B-48 | 2248-524 | 56 capsules, hard, 30 mg | 56 gélules, 30 mg | G | 23,50 | 23,50 | 3,70 | 6,16 |
| | 2248-524 | | | | 13,94 | 13,94 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| B-48 | 2650-745 2650-745 | 84 capsules, hard, 30 mg | 84 gélules, 30 mg | G | 22,86 13,39 | 22,86 13,39 | 3,55 | 5,92 |
| B-48 * | 0781-880 | 1 capsule, hard, 30 mg | 1 gélule, 30 mg | G | 0,2057 | 0,2057 | | |
| B-48 ** | 0781-880 | 1 capsule, hard, 30 mg | 1 gélule, 30 mg | G | 0,1689 | 0,1689 | | |
| B-48 *** | 0781-880 | 1 capsule, hard, 30 mg | 1 gélule, 30 mg | G | 0,2083 | 0,2083 | 0,0423 | 0,0705 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOL KRKA 15 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: A02BC03 | | | | |
| B-48 | 3318-813 3318-813 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 15 mg | G | 14,69 7,13 | 14,69 7,13 | 1,89 | 3,15 |
| B-48 * | 7714-512 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1643 | 0,1643 | | |
| B-48 ** | 7714-512 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1350 | 0,1350 | | |
| B-48 *** | 7714-512 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1666 | 0,1666 | 0,0337 | 0,0562 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOL KRKA 30 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: A02BC03 | | | | |
| B-48 | 3318-755 3318-755 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 23,53 13,97 | 23,53 13,97 | 3,70 | 6,17 |
| B-48 * | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,3220 | 0,3220 | | |
| B-48 ** | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2645 | 0,2645 | | |
| B-48 *** | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,3244 | 0,3244 | 0,0661 | 0,1102 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC03 | | | | |
| B-48 | 2341-493 2341-493 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 15 mg | G | 15,39 7,67 | 15,39 7,67 | 2,03 | 3,39 |
| B-48 * | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-48 ** | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | |
| B-48 *** | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1791 | 0,1791 | 0,0362 | 0,0605 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC03 | | |
| B-48 | 2341-527 2341-527 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 24,13 14,49 | 24,13 14,49 | 3,82 | 6,41 |
| B-48 | 2341-519 2341-519 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 27,96 17,84 | 27,96 17,84 | 4,35 | 7,32 |
| B-48 * | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2349 | 0,2349 | | |
| B-48 ** | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,1930 | 0,1930 | | |
| B-48 *** | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2306 | 0,2306 | 0,0444 | 0,0747 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|
| LANSOPRAZOLE EG 15 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC03 | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2257-608 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 15 mg | G | 15,39 | 15,39 | 2,03 | 3,39 |
| | 2257-608 | | | | 7,67 | 7,67 | | |
| B-48 * | 0782-235 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-48 ** | 0782-235 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | |
| B-48 *** | 0782-235 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1791 | 0,1791 | 0,0362 | 0,0605 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOLE EG 30 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC03 | | |
| B-48 | 2257-632 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 24,45 | 24,45 | 3,86 | 6,49 |
| | 2257-632 | | | | 14,78 | 14,78 | | |
| B-48 | 2257-590 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 27,95 | 27,95 | 4,35 | 7,31 |
| | 2257-590 | | | | 17,83 | 17,83 | | |
| B-48 * | 0782-243 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2348 | 0,2348 | | |
| B-48 ** | 0782-243 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,1929 | 0,1929 | | |
| B-48 *** | 0782-243 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2305 | 0,2305 | 0,0444 | 0,0746 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC03 | | | | |
| B-48 | 3494-804 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 15 mg | G | 15,39 | 15,39 | 2,03 | 3,39 |
| | 3494-804 | | | | 7,67 | 7,67 | | |
| B-48 * | 0783-894 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | | |
| B-48 ** | 0783-894 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | |
| B-48 *** | 0783-894 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1791 | 0,1791 | 0,0362 | 0,0605 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC03 | | |
| B-48 | 2328-557 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 24,13 | 24,13 | 3,82 | 6,41 |
| | 2328-557 | | | | 14,49 | 14,49 | | |
| B-48 | 2328-565 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 26,73 | 26,73 | 4,18 | 7,03 |
| | 2328-565 | | | | 16,77 | 16,77 | | |
| B-48 * | 0783-886 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2208 | 0,2208 | | |
| B-48 ** | 0783-886 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,1814 | 0,1814 | | |
| B-48 *** | 0783-886 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2181 | 0,2181 | 0,0427 | 0,0717 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| LOSEC MUPS 10 mg | | EUROCEPT | | ATC: A02BC01 | | | | |
| B-48 | 1618-214 | 56 maagsapresistente tabletten, 10 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 10 mg | R | 13,90 | 13,90 | 1,73 | 2,88 |
| | 1618-214 | | | | 6,52 | 6,52 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 * | 0764-167 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1502 | 0,1502 | | |
| B-48 ** | 0764-167 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1234 | 0,1234 | | |
| B-48 *** | 0764-167 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1524 | 0,1524 | 0,0309 | 0,0514 |

| LOSEC MUPS 20 mg | | EUROCEPT | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2095-438 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 2095-438 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 * | 0764-175 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,2514 | 0,2514 | | |
| B-48 ** | 0764-175 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,2064 | 0,2064 | | |
| B-48 *** | 0764-175 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,2548 | 0,2548 | 0,0516 | 0,0861 |

| NEXIAM 20 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: A02BC05 | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1597-004 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 15,72 | 15,72 | 2,10 | 3,50 |
| | 1597-004 | | | | 7,92 | 7,92 | | |
| B-48 | 2692-010 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 19,00 | 19,00 | 2,76 | 4,61 |
| | 2692-010 | | | | 10,42 | 10,42 | | |
| B-48 * | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1372 | 0,1372 | | |
| B-48 ** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1128 | 0,1128 | | |
| B-48 *** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1391 | 0,1391 | 0,0282 | 0,0470 |

| NEXIAM 40 mg | | GRUNENTHAL | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC05 | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1596-998 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | R | 12,96 | 12,96 | 1,54 | 2,57 |
| | 1596-998 | | | | 5,81 | 5,81 | | |
| B-48 * | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,2679 | 0,2679 | | |
| B-48 ** | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,2200 | 0,2200 | | |
| B-48 *** | 0768-978 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | R | 0,2714 | 0,2714 | 0,0550 | 0,0918 |

| OMEPRAZOL AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC01 | | | | |
|--------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 4380-119 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 13,30 | 13,30 | 1,61 | 2,68 |
| | 4380-119 | | | | 6,07 | 6,07 | | |
| B-48 | 4380-127 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 17,88 | 17,88 | 2,54 | 4,23 |
| | 4380-127 | | | | 9,57 | 9,57 | | |
| B-48 * | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1235 | 0,1235 | | |
| B-48 ** | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1014 | 0,1014 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 *** | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1252 | 0,1252 | 0,0254 | 0,0423 |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| OMEPRAZOL AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|--------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 3527-686 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 18,85 | 18,85 | 2,73 | 4,56 |
| | 3527-686 | | | | 10,31 | 10,31 | | |
| B-48 | 3078-151 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 23,10 | 23,10 | 3,60 | 6,01 |
| | 3078-151 | | | | 13,59 | 13,59 | | |
| B-48 * | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1754 | 0,1754 | | |
| B-48 ** | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1441 | 0,1441 | | |
| B-48 *** | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1773 | 0,1773 | 0,0360 | 0,0601 |

| OMEPRAZOL AB 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC01 | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 3078-169 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 19,82 | 19,82 | 2,93 | 4,89 |
| | 3078-169 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-48 | 3527-694 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 31,84 | 31,84 | 4,90 | 8,23 |
| | 3527-694 | | | | 21,22 | 21,22 | | |
| B-48 * | 7705-189 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4889 | 0,4889 | | |
| B-48 ** | 7705-189 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4016 | 0,4016 | | |
| B-48 *** | 7705-189 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4728 | 0,4728 | 0,0875 | 0,1470 |

| OMEPRAZOL APOTEX 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2227-171 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 19,81 | 19,81 | 2,93 | 4,88 |
| | 2227-171 | | | | 11,05 | 11,05 | | |
| B-48 * | 0781-039 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5093 | 0,5093 | | |
| B-48 ** | 0781-039 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4182 | 0,4182 | | |
| B-48 *** | 0781-039 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5160 | 0,5160 | 0,1046 | 0,1743 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1767-227 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 14,07 | 14,07 | 1,76 | 2,94 |
| | 1767-227 | | | | 6,65 | 6,65 | | |
| B-48 | 1767-243 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 18,95 | 18,95 | 2,76 | 4,59 |
| | 1767-243 | | | | 10,39 | 10,39 | | |
| B-48 * | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1368 | 0,1368 | | |
| B-48 ** | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1123 | 0,1123 | | |
| B-48 *** | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1554 | 0,1554 | 0,0314 | 0,0525 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: A02BC01 | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-48 | 1767-367 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 1767-367 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 | 1767-318 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,07 | 24,07 | 3,81 | 6,40 |
| | 1767-318 | | | | 14,44 | 14,44 | | |
| B-48 * | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-48 ** | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | |
| B-48 *** | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1909 | 0,1909 | 0,0389 | 0,0653 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: A02BC01 | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| B-48 | 2647-089 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 2647-089 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 | 3373-594 | 98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 98 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,07 | 24,07 | 3,81 | 6,40 |
| | 3373-594 | | | | 14,44 | 14,44 | | |
| B-48 * | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| B-48 ** | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | |
| B-48 *** | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1909 | 0,1909 | 0,0389 | 0,0653 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1767-300 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 13,99 | 13,99 | 1,75 | 2,92 |
| | 1767-300 | | | | 6,60 | 6,60 | | |
| B-48 | 1767-342 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 19,82 | 19,82 | 2,93 | 4,89 |
| | 1767-342 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-48 | 1767-292 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 1767-292 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0775-353 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-48 | 3520-350 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 19,82 | 19,82 | 2,93 | 4,89 |
| | 3520-350 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-48 | 2647-097 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 2647-097 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0794-305 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 ** | 0794-305 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0794-305 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| OMEPRAZOL TEVA 10 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC01 | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 3494-812 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 13,99 | 13,99 | 1,75 | 2,92 |
| | 3494-812 | | | | 6,60 | 6,60 | | |
| B-48 | 2705-713 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettentainer) | 100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier) | G | 18,22 | 18,22 | 2,61 | 4,34 |
| | 2705-713 | | | | 9,83 | 9,83 | | |
| B-48 * | 0787-671 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1269 | 0,1269 | | |
| B-48 ** | 0787-671 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1042 | 0,1042 | | |
| B-48 *** | 0787-671 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1286 | 0,1286 | 0,0261 | 0,0434 |

| OMEPRAZOL TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|----------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2726-172 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer) | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 19,44 | 19,44 | 2,86 | 4,76 |
| | 2726-172 | | | | 10,77 | 10,77 | | |
| B-48 | 2705-747 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer) | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 23,95 | 23,95 | 3,80 | 6,33 |
| | 2705-747 | | | | 14,33 | 14,33 | | |
| B-48 * | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1849 | 0,1849 | | |
| B-48 ** | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1519 | 0,1519 | | |
| B-48 *** | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1858 | 0,1858 | 0,0380 | 0,0633 |

| OMEPRAZOL TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC01 | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2726-180 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer) | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier) | G | 20,19 | 20,19 | 3,01 | 5,01 |
| | 2726-180 | | | | 11,34 | 11,34 | | |
| B-48 | 3494-820 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 32,19 | 32,19 | 4,94 | 8,31 |
| | 3494-820 | | | | 21,52 | 21,52 | | |
| B-48 * | 0787-689 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4959 | 0,4959 | | |
| B-48 ** | 0787-689 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4073 | 0,4073 | | |
| B-48 *** | 0787-689 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4791 | 0,4791 | 0,0882 | 0,1484 |

| OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC01 | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-48 | 1712-249 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 14,09 | 14,09 | 1,77 | 2,95 |
| | 1712-249 | | | | 6,67 | 6,67 | | |
| B-48 | 2417-731 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 19,23 | 19,23 | 2,81 | 4,69 |
| | 2417-731 | | | | 10,60 | 10,60 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 * | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1368 | 0,1368 | | |
| B-48 ** | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1124 | 0,1124 | | |
| B-48 *** | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1386 | 0,1386 | 0,0281 | 0,0469 |

| OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|-------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1705-466 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 1705-466 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 | 2417-749 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,34 | 24,34 | 3,85 | 6,46 |
| | 2417-749 | | | | 14,68 | 14,68 | | |
| B-48 * | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| B-48 ** | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| B-48 *** | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC01 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 1712-231 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 20,49 | 20,49 | 3,07 | 5,11 |
| | 1712-231 | | | | 11,57 | 11,57 | | |
| B-48 | 2119-584 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 2119-584 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0772-046 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 0772-046 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0772-046 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| OMEPRAZOLE EG 10 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC01 | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2141-224 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 14,07 | 14,07 | 1,76 | 2,94 |
| | 2141-224 | | | | 6,65 | 6,65 | | |
| B-48 | 2455-293 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 17,92 | 17,92 | 2,55 | 4,24 |
| | 2455-293 | | | | 9,60 | 9,60 | | |
| B-48 * | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1239 | 0,1239 | | |
| B-48 ** | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1018 | 0,1018 | | |
| B-48 *** | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1256 | 0,1256 | 0,0255 | 0,0424 |

| OMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| B-48 | 2393-114 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 2393-114 | | | | 10,91 | 10,91 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2455-301 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,34 | 24,34 | 3,85 | 6,46 |
| | 2455-301 | | | | 14,68 | 14,68 | | |
| B-48 * | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| B-48 ** | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| B-48 *** | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| B-48 | 4705-174 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 4705-174 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 | 4581-203 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,34 | 24,34 | 3,85 | 6,46 |
| | 4581-203 | | | | 14,68 | 14,68 | | |
| B-48 * | 7735-301 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| B-48 ** | 7735-301 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| B-48 *** | 7735-301 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| B-48 | 2753-200 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 19,63 | 19,63 | 2,89 | 4,82 |
| | 2753-200 | | | | 10,91 | 10,91 | | |
| B-48 | 2753-218 | 100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 100 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 24,34 | 24,34 | 3,85 | 6,46 |
| | 2753-218 | | | | 14,68 | 14,68 | | |
| B-48 * | 0799-825 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| B-48 ** | 0799-825 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| B-48 *** | 0799-825 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOLE EG 40 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC01 | | | | |
| B-48 | 2179-935 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 19,82 | 19,82 | 2,93 | 4,89 |
| | 2179-935 | | | | 11,06 | 11,06 | | |
| B-48 | 2181-642 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 2181-642 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0770-958 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 0770-958 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0770-958 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|--|--|--|
| OMEPRAZOLE EG 40 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: A02BC01 | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 4765-251 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 4765-251 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 7739-055 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 7739-055 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 7739-055 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC01 | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2600-559 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 2600-559 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0792-424 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 0792-424 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0792-424 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2616-530 | 56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg | 56 gélules gastro-résistantes, 40 mg | G | 33,25 | 33,25 | 5,09 | 8,56 |
| | 2616-530 | | | | 22,45 | 22,45 | | |
| B-48 * | 0793-307 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,5173 | 0,5173 | | |
| B-48 ** | 0793-307 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4250 | 0,4250 | | |
| B-48 *** | 0793-307 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,4980 | 0,4980 | 0,0909 | 0,1529 |

| PANTOMED 20 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2557-205 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,26 | 2,10 |
| | 2557-205 | | | | 4,75 | 4,75 | | |
| B-48 | 2557-213 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 2557-213 | | | | 8,12 | 8,12 | | |
| B-48 | 2626-968 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 2626-968 | | | | 8,12 | 8,12 | | |
| B-48 * | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 2732-782 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,77 | 11,77 | 1,30 | 2,17 |
| | 2732-782 | | | | 4,90 | 4,90 | | |
| B-48 | 2732-790 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 2732-790 | | | | 8,12 | 8,12 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 * | 0799-361 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 0799-361 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 0799-361 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOMED 40 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2557-163 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 2557-163 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOMED 40 mg (Exim Pharma) | | EXIM PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 4771-663 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,73 | 19,73 | 2,91 | 4,85 |
| | 4771-663 | | | | 10,98 | 10,98 | | |
| B-48 * | 7740-129 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2530 | 0,2530 | | |
| B-48 ** | 7740-129 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2079 | 0,2079 | | |
| B-48 *** | 7740-129 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2565 | 0,2565 | 0,0520 | 0,0866 |

| PANTOMED 40 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: A02BC02 | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 4819-595 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 4819-595 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 7740-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 7740-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 7740-210 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2732-808 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 2732-808 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 0799-379 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 0799-379 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 0799-379 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 2650-422 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,26 | 2,10 |
| | 2650-422 | | | | 4,75 | 4,75 | | |
| B-48 * | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1095 | 0,1095 | | |
| B-48 ** | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0900 | 0,0900 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 *** | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1109 | 0,1109 | 0,0225 | 0,0375 |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 4381-109 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,26 | 2,10 |
| | 4381-109 | | | | 4,75 | 4,75 | | |
| B-48 | 4381-117 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,59 | 15,59 | 2,07 | 3,46 |
| | 4381-117 | | | | 7,82 | 7,82 | | |
| B-48 | 4381-125 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,70 | 15,70 | 2,09 | 3,49 |
| | 4381-125 | | | | 7,90 | 7,90 | | |
| B-48 * | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1019 | 0,1019 | | |
| B-48 ** | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0837 | 0,0837 | | |
| B-48 *** | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1034 | 0,1034 | 0,0209 | 0,0349 |

| PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 4381-141 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 18,61 | 18,61 | 2,69 | 4,48 |
| | 4381-141 | | | | 10,13 | 10,13 | | |
| B-48 * | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2334 | 0,2334 | | |
| B-48 ** | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1918 | 0,1918 | | |
| B-48 *** | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2419 | 0,2419 | 0,0489 | 0,0818 |

| PANTOPRAZOL KRKA 20 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: A02BC02 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 4582-128 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,89 | 15,89 | 2,13 | 3,56 |
| | 4582-128 | | | | 8,05 | 8,05 | | |
| B-48 * | 7734-924 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1039 | 0,1039 | | |
| B-48 ** | 7734-924 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0853 | 0,0853 | | |
| B-48 *** | 7734-924 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1053 | 0,1053 | 0,0213 | 0,0356 |

| PANTOPRAZOL KRKA 40 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | ATC: A02BC02 | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 4582-136 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 18,87 | 18,87 | 2,74 | 4,57 |
| | 4582-136 | | | | 10,33 | 10,33 | | |
| B-48 * | 7734-932 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2380 | 0,2380 | | |
| B-48 ** | 7734-932 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1955 | 0,1955 | | |
| B-48 *** | 7734-932 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2412 | 0,2412 | 0,0489 | 0,0816 |

| PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC02 | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|
| B-48 | 2568-061 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,61 | 11,61 | 1,27 | 2,11 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|--------|
| | 2568-061 | | | | 4,78 | 4,78 | | |
| B-48 | 2568-079 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,77 | 15,77 | 2,11 | 3,52 |
| | 2568-079 | | | | 7,96 | 7,96 | | |
| B-48 * | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: A02BC02 | | | | |
| B-48 | 3689-940 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,77 | 15,77 | 2,11 | 3,52 |
| | 3689-940 | | | | 7,96 | 7,96 | | |
| B-48 * | 7722-796 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 7722-796 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 7722-796 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC02 | | | | |
| B-48 | 2568-095 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 2568-095 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) | | IMPEXECO | | ATC: A02BC02 | | | | |
| B-48 | 3689-957 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 3689-957 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 7722-820 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 7722-820 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 7722-820 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|
| PANTOPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC02 | | | | |
| B-48 | 2555-175 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,77 | 11,77 | 1,30 | 2,17 |
| | 2555-175 | | | | 4,90 | 4,90 | | |
| B-48 | 2555-142 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,77 | 15,77 | 2,11 | 3,52 |
| | 2555-142 | | | | 7,96 | 7,96 | | |
| B-48 | 3303-930 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 3303-930 | | | | 8,12 | 8,12 | | |
| B-48 * | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 ** | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 3678-018 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,77 | 11,77 | 1,30 | 2,17 |
| | 3678-018 | | | | 4,90 | 4,90 | | |
| B-48 | 3678-059 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,77 | 15,77 | 2,11 | 3,52 |
| | 3678-059 | | | | 7,96 | 7,96 | | |
| B-48 * | 7721-699 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 7721-699 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 7721-699 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOPRAZOLE EG 40 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2555-126 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 2555-126 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 3678-075 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 3678-075 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 7721-681 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 7721-681 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 7721-681 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 3494-838 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,77 | 11,77 | 1,30 | 2,17 |
| | 3494-838 | | | | 4,90 | 4,90 | | |
| B-48 | 3025-152 | 98 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 98 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,75 | 15,75 | 2,11 | 3,51 |
| | 3025-152 | | | | 7,94 | 7,94 | | |
| B-48 | 3093-200 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 3093-200 | | | | 8,12 | 8,12 | | |
| B-48 * | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 *** | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 3494-846 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,02 | 19,02 | 2,77 | 4,61 |
| | 3494-846 | | | | 10,44 | 10,44 | | |
| B-48 | 3912-128 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,02 | 19,02 | 2,77 | 4,61 |
| | 3912-128 | | | | 10,44 | 10,44 | | |
| B-48 * | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | | |
| B-48 ** | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1977 | 0,1977 | | |
| B-48 *** | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2438 | 0,2438 | 0,0495 | 0,0823 |

| PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 2575-579 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 11,58 | 11,58 | 1,26 | 2,10 |
| | 2575-579 | | | | 4,75 | 4,75 | | |
| B-48 | 2575-553 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 15,98 | 15,98 | 2,15 | 3,59 |
| | 2575-553 | | | | 8,12 | 8,12 | | |
| B-48 * | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| B-48 ** | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| B-48 *** | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC02 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2575-538 | 56 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 19,39 | 19,39 | 2,84 | 4,74 |
| | 2575-538 | | | | 10,72 | 10,72 | | |
| B-48 * | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| B-48 ** | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| B-48 *** | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PARIET 10 mg | | JANSSEN-CILAG | | ATC: A02BC04 | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| B-48 | 1555-804 | 56 tabletten, 10 mg | 56 comprimés, 10 mg | R | 13,27 | 13,27 | 1,60 | 2,67 |
| | 1555-804 | | | | 6,05 | 6,05 | | |
| B-48 * | 0766-949 | 1 tablet, 10 mg | 1 comprimé, 10 mg | R | 0,1395 | 0,1395 | | |
| B-48 ** | 0766-949 | 1 tablet, 10 mg | 1 comprimé, 10 mg | R | 0,1145 | 0,1145 | | |
| B-48 *** | 0766-949 | 1 tablet, 10 mg | 1 comprimé, 10 mg | R | 0,1412 | 0,1412 | 0,0286 | 0,0477 |

| SEDACID 10 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: A02BC01 | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-48 | 2108-728 | 56 maagsapresistente tabletten, 10 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 10 mg | R | 13,35 | 13,35 | 1,62 | 2,70 |
| | 2108-728 | | | | 6,10 | 6,10 | | |
| B-48 * | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1405 | 0,1405 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| B-48 ** | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1155 | 0,1155 | | |
| B-48 *** | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1425 | 0,1425 | 0,0289 | 0,0482 |

| SEDACID 20 mg | | LABORATOIRES SMB | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|---------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|--------|
| B-48 | 2108-751 | 56 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 56 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 18,86 | 18,86 | 2,74 | 4,56 |
| | 2108-751 | | | | 10,32 | 10,32 | | |
| B-48 | 2451-961 | 100 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 100 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 23,10 | 23,10 | 3,60 | 6,01 |
| | 2451-961 | | | | 13,59 | 13,59 | | |
| B-48 * | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1754 | 0,1754 | | |
| B-48 ** | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1441 | 0,1441 | | |
| B-48 *** | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1773 | 0,1773 | 0,0360 | 0,0601 |

Paragraaf 30000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie C:

Paragraphe 30000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie C:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |

| ESOMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2893-477 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 8,53 | 8,53 | 2,15 | 2,15 |
| | 2893-477 | | | | 2,43 | 2,43 | | |
| C-31 | 2893-485 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 10,80 | 10,80 | 3,68 | 3,68 |
| | 2893-485 | | | | 4,16 | 4,16 | | |
| C-31 * | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1252 | 0,1252 | | |
| C-31 ** | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1029 | 0,1029 | | |
| C-31 *** | 0755-264 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1269 | 0,1269 | 0,0257 | 0,0429 |

| ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC05 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| C-31 | 2738-516 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 10,54 | 10,54 | 3,50 | 3,50 |
| | 2738-516 | | | | 3,96 | 3,96 | | |
| C-31 * | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1251 | 0,1251 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| C-31 ** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1028 | 0,1028 | | |
| C-31 *** | 0757-526 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1268 | 0,1268 | 0,0257 | 0,0429 |

| ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC05 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2886-687 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 10,90 | 10,90 | 3,74 | 3,74 |
| | 2886-687 | | | | 4,23 | 4,23 | | |
| C-31 * | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1373 | 0,1373 | | |
| C-31 ** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1128 | 0,1128 | | |
| C-31 *** | 0753-772 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1391 | 0,1391 | 0,0282 | 0,0470 |

| LANSOPRAZOL KRKA 30 mg | | KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) | | ATC: A02BC03 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 3318-771 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 14,69 | 14,69 | 6,30 | 6,30 |
| | 3318-771 | | | | 7,13 | 7,13 | | |
| C-31 * | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,3220 | 0,3220 | | |
| C-31 ** | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2645 | 0,2645 | | |
| C-31 *** | 7714-520 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,3244 | 0,3244 | 0,0661 | 0,1102 |

| LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC03 | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2341-485 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 15 mg | G | 10,37 | 10,37 | 3,39 | 3,39 |
| | 2341-485 | | | | 3,83 | 3,83 | | |
| C-31 * | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1768 | 0,1768 | | |
| C-31 ** | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1452 | 0,1452 | | |
| C-31 *** | 0784-488 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg | 1 gélule gastro-résistante, 15 mg | G | 0,1791 | 0,1791 | 0,0362 | 0,0605 |

| LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC03 | | |
|--------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| C-31 | 2341-535 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 30 mg | G | 15,20 | 15,20 | 6,65 | 6,65 |
| | 2341-535 | | | | 7,52 | 7,52 | | |
| C-31 * | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2349 | 0,2349 | | |
| C-31 ** | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,1930 | 0,1930 | | |
| C-31 *** | 0784-496 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg | 1 gélule gastro-résistante, 30 mg | G | 0,2306 | 0,2306 | 0,0444 | 0,0747 |

| NEXIAM 20 mg | | GRUNENTHAL | | ATC: A02BC05 | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| C-31 | 1596-980 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 10,91 | 10,91 | 3,75 | 3,75 |
| | 1596-980 | | | | 4,24 | 4,24 | | |
| C-31 * | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1372 | 0,1372 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| C-31 ** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1128 | 0,1128 | | |
| C-31 *** | 0768-960 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1391 | 0,1391 | 0,0282 | 0,0470 |

| OMEPRAZOL AB 10 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC01 | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 4380-101 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 8,86 | 8,86 | 2,37 | 2,37 |
| | 4380-101 | | | | 2,68 | 2,68 | | |
| C-31 * | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1235 | 0,1235 | | |
| C-31 ** | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1014 | 0,1014 | | |
| C-31 *** | 7731-664 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1252 | 0,1252 | 0,0254 | 0,0423 |

| OMEPRAZOL AB 20 mg | | AUROBINDO NV | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| C-31 | 3078-144 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 12,85 | 12,85 | 5,06 | 5,06 |
| | 3078-144 | | | | 5,72 | 5,72 | | |
| C-31 * | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1754 | 0,1754 | | |
| C-31 ** | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1441 | 0,1441 | | |
| C-31 *** | 7705-171 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1773 | 0,1773 | 0,0360 | 0,0601 |

| OMEPRAZOL APOTEX 20 mg | | AUROBINDO NV | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| C-31 | 2227-130 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 12,85 | 12,85 | 5,06 | 5,06 |
| | 2227-130 | | | | 5,72 | 5,72 | | |
| C-31 * | 0781-021 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,2636 | 0,2636 | | |
| C-31 ** | 0781-021 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,2164 | 0,2164 | | |
| C-31 *** | 0781-021 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,2673 | 0,2673 | 0,1807 | 0,1807 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC01 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 1767-235 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 7,72 | 7,72 | 1,52 | 1,52 |
| | 1767-235 | | | | 1,72 | 1,72 | | |
| C-31 | 1767-250 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 8,95 | 8,95 | 2,42 | 2,42 |
| | 1767-250 | | | | 2,74 | 2,74 | | |
| C-31 * | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1368 | 0,1368 | | |
| C-31 ** | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1123 | 0,1123 | | |
| C-31 *** | 0775-346 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1554 | 0,1554 | 0,0314 | 0,0525 |

| OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
|------------------------|--|--------|--|---|--|--------------|--|--|
|------------------------|--|--------|--|---|--|--------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 1724-772 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 8,84 | 8,84 | 2,35 | 2,35 |
| | 1724-772 | | | | 2,66 | 2,66 | | |
| C-31 | 1767-326 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 12,86 | 12,86 | 5,06 | 5,06 |
| | 1767-326 | | | | 5,73 | 5,73 | | |
| C-31 * | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| C-31 ** | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | |
| C-31 *** | 0775-361 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1909 | 0,1909 | 0,0389 | 0,0653 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) | | PI-PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| C-31 | 3546-116 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 12,86 | 12,86 | 5,06 | 5,06 |
| | 3546-116 | | | | 5,73 | 5,73 | | |
| C-31 * | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1901 | 0,1901 | | |
| C-31 ** | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1562 | 0,1562 | | |
| C-31 *** | 0794-297 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1909 | 0,1909 | 0,0389 | 0,0653 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|---|-------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOL TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| C-31 | 2801-504 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer) | 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 8,86 | 8,86 | 2,37 | 2,37 |
| | 2801-504 | | | | 2,68 | 2,68 | | |
| C-31 | 2726-164 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer) | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier) | G | 12,96 | 12,96 | 5,14 | 5,14 |
| | 2726-164 | | | | 5,81 | 5,81 | | |
| C-31 * | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1849 | 0,1849 | | |
| C-31 ** | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1519 | 0,1519 | | |
| C-31 *** | 0787-663 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1858 | 0,1858 | 0,0380 | 0,0633 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC01 | | | | |
| C-31 | 1712-215 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 9,19 | 9,19 | 2,59 | 2,59 |
| | 1712-215 | | | | 2,93 | 2,93 | | |
| C-31 * | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1368 | 0,1368 | | |
| C-31 ** | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1124 | 0,1124 | | |
| C-31 *** | 0772-038 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1386 | 0,1386 | 0,0281 | 0,0469 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|------|------|
| OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| C-31 | 1712-223 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 9,01 | 9,01 | 2,47 | 2,47 |
| | 1712-223 | | | | 2,79 | 2,79 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 1705-441 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 13,20 | 13,20 | 5,29 | 5,29 |
| | 1705-441 | | | | 5,99 | 5,99 | | |
| C-31 * | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| C-31 ** | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| C-31 *** | 0771-758 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| OMEPRAZOLE EG 10 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC01 | | | | |
| C-31 | 2141-158 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 10 mg | G | 9,08 | 9,08 | 2,52 | 2,52 |
| | 2141-158 | | | | 2,85 | 2,85 | | |
| C-31 * | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1239 | 0,1239 | | |
| C-31 ** | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1018 | 0,1018 | | |
| C-31 *** | 0778-001 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg | 1 gélule gastro-résistante, 10 mg | G | 0,1256 | 0,1256 | 0,0255 | 0,0424 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|
| OMEPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | |
| C-31 | 2582-831 | 14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 14 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 8,97 | 8,97 | 2,43 | 2,43 |
| | 2582-831 | | | | 2,75 | 2,75 | | |
| C-31 | 1729-169 | 28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg | 28 gélules gastro-résistantes, 20 mg | G | 13,14 | 13,14 | 5,26 | 5,26 |
| | 1729-169 | | | | 5,95 | 5,95 | | |
| C-31 * | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1894 | 0,1894 | | |
| C-31 ** | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1556 | 0,1556 | | |
| C-31 *** | 0785-386 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg | 1 gélule gastro-résistante, 20 mg | G | 0,1897 | 0,1897 | 0,0385 | 0,0646 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| PANTOMED 20 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A02BC02 | | | | |
| C-31 | 2557-197 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,56 | 8,56 | 2,16 | 2,16 |
| | 2557-197 | | | | 2,44 | 2,44 | | |
| C-31 * | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| C-31 ** | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| C-31 *** | 0791-186 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| PANTOMED 40 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: A02BC02 | | | | |
| C-31 | 2557-155 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,53 | 12,53 | 4,84 | 4,84 |
| | 2557-155 | | | | 5,48 | 5,48 | | |
| C-31 * | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| C-31 ** | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| C-31 *** | 0791-194 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2650-414 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,49 | 8,49 | 2,11 | 2,11 | |
| | 2650-414 | | | | 2,39 | 2,39 | | | |
| C-31 * | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1095 | 0,1095 | | | |
| C-31 ** | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0900 | 0,0900 | | | |
| C-31 *** | 0795-104 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1109 | 0,1109 | 0,0225 | 0,0375 | |

| PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2650-448 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,14 | 12,14 | 4,58 | 4,58 | |
| | 2650-448 | | | | 5,18 | 5,18 | | | |
| C-31 * | 0795-096 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2386 | 0,2386 | | | |
| C-31 ** | 0795-096 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1961 | 0,1961 | | | |
| C-31 *** | 0795-096 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2419 | 0,2419 | 0,1636 | 0,1636 | |

| PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 4381-091 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,49 | 8,49 | 2,11 | 2,11 | |
| | 4381-091 | | | | 2,39 | 2,39 | | | |
| C-31 * | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1019 | 0,1019 | | | |
| C-31 ** | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0837 | 0,0837 | | | |
| C-31 *** | 7731-979 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1034 | 0,1034 | 0,0209 | 0,0349 | |

| PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg | | AUROBINDO NV | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 4381-133 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,14 | 12,14 | 4,58 | 4,58 | |
| | 4381-133 | | | | 5,18 | 5,18 | | | |
| C-31 * | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2334 | 0,2334 | | | |
| C-31 ** | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1918 | 0,1918 | | | |
| C-31 *** | 7731-961 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2419 | 0,2419 | 0,0489 | 0,0818 | |

| PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
| C-31 | 2568-053 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,52 | 8,52 | 2,14 | 2,14 | |
| | 2568-053 | | | | 2,42 | 2,42 | | | |
| C-31 * | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | | |
| C-31 ** | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| C-31 *** | 0791-517 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg | | SANDOZ | | ATC: A02BC02 | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2568-087 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,23 | 12,23 | 4,64 | 4,64 |
| | 2568-087 | | | | 5,25 | 5,25 | | |
| C-31 * | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| C-31 ** | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| C-31 *** | 0791-525 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOPRAZOLE EG 20 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2555-159 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,56 | 8,56 | 2,16 | 2,16 |
| | 2555-159 | | | | 2,44 | 2,44 | | |
| C-31 * | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| C-31 ** | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| C-31 *** | 0791-988 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOPRAZOLE EG 40 mg | | EUROGENERICS | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 2555-118 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,25 | 12,25 | 4,66 | 4,66 |
| | 2555-118 | | | | 5,27 | 5,27 | | |
| C-31 * | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | |
| C-31 ** | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | |
| C-31 *** | 0791-996 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 |

| PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| C-31 | 3025-145 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,56 | 8,56 | 2,16 | 2,16 |
| | 3025-145 | | | | 2,44 | 2,44 | | |
| C-31 * | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | |
| C-31 ** | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | |
| C-31 *** | 0791-574 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 |

| PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: A02BC02 | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| C-31 | 3025-160 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,17 | 12,17 | 4,61 | 4,61 |
| | 3025-160 | | | | 5,21 | 5,21 | | |
| C-31 * | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2405 | 0,2405 | | |
| C-31 ** | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,1977 | 0,1977 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| C-31 *** | 0791-582 | 1 maagsapresistente tablet, 40 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg | G | 0,2438 | 0,2438 | 0,0495 | 0,0823 |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

| PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2575-512 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | G | 8,56 | 8,56 | 2,16 | 2,16 | |
| | 2575-512 | | | | 2,44 | 2,44 | | | |
| C-31 * | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1048 | 0,1048 | | | |
| C-31 ** | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,0861 | 0,0861 | | | |
| C-31 *** | 0792-895 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | G | 0,1062 | 0,1062 | 0,0215 | 0,0359 | |

| PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg | | VIATRIS | | ATC: A02BC02 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2575-546 | 28 maagsapresistente tabletten, 40 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 40 mg | G | 12,53 | 12,53 | 4,84 | 4,84 | |
| | 2575-546 | | | | 5,48 | 5,48 | | | |
| C-31 * | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2470 | 0,2470 | | | |
| C-31 ** | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2029 | 0,2029 | | | |
| C-31 *** | 0792-903 | 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg | 1 gélule gastro-résistante, 40 mg | G | 0,2504 | 0,2504 | 0,0507 | 0,0846 | |

| SEDACID 10 mg | | LABORATOIRES SMB | | ATC: A02BC01 | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2108-694 | 14 maagsapresistente tabletten, 10 mg | 14 comprimés gastro-résistants, 10 mg | R | 7,73 | 7,73 | 1,53 | 1,53 | |
| | 2108-694 | | | | 1,73 | 1,73 | | | |
| C-31 | 2108-702 | 28 maagsapresistente tabletten, 10 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 10 mg | R | 8,88 | 8,88 | 2,38 | 2,38 | |
| | 2108-702 | | | | 2,69 | 2,69 | | | |
| C-31 * | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1405 | 0,1405 | | | |
| C-31 ** | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1155 | 0,1155 | | | |
| C-31 *** | 0776-237 | 1 maagsapresistente tablet, 10 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 10 mg | R | 0,1425 | 0,1425 | 0,0289 | 0,0482 | |

| SEDACID 20 mg | | LABORATOIRES SMB | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: A02BC01 | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|--------|--------|--|
| C-31 | 2108-736 | 14 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 14 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 8,88 | 8,88 | 2,38 | 2,38 | |
| | 2108-736 | | | | 2,69 | 2,69 | | | |
| C-31 | 2108-744 | 28 maagsapresistente tabletten, 20 mg | 28 comprimés gastro-résistants, 20 mg | R | 12,99 | 12,99 | 5,15 | 5,15 | |
| | 2108-744 | | | | 5,83 | 5,83 | | | |
| C-31 * | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1754 | 0,1754 | | | |
| C-31 ** | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1441 | 0,1441 | | | |
| C-31 *** | 0776-245 | 1 maagsapresistente tablet, 20 mg | 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg | R | 0,1773 | 0,1773 | 0,0360 | 0,0601 | |

Paragraaf 40000

Paragraphe 40000

Fibraten (ATC C10AB) :

1° wetenschappelijk verantwoorde aanbevelingen over het gebruik en het voorschrijven van de betrokken therapeutische klassen of sub-klassen van farmaceutische specialiteiten, gebaseerd op de principes van "evidence-based medicine", zoals bedoeld in artikel 73, § 2, tweede lid van de Wet, waarvan de naleving aanleiding geeft tot de vergoeding van het voorschrift:

a) De specialiteiten vermeld in punt c) komen voor vergoeding in aanmerking in categorie B, wanneer ze zijn toegediend bij rechthebbenden voor :

1. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol \geq 190 mg/dl, of LDL-cholesterol \geq 115 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in de volgende risicosituatie bevinden:

de berekening van het individuele absolute cardio-vasculaire risico een resultaat geeft nu (of had, of zou geven op een bepaalde datum (*)) gelijk of hoger dan 5 % op 10 jaar, waarbij dit risico werd berekend op basis van het SCORE model aangepast aan de Belgische situatie ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) rekening houdend met de leeftijd, het geslacht, het cholesterolniveau, de systolische arteriële druk en tabagisme.

(* in het geval dat het volgen van een behandeling met een hypolipemierend geneesmiddel momenteel een verbetering van zijn/haar risicoprofiel heeft veroorzaakt.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

2. de behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie (gedefinieerd als totaal cholesterol \geq 175 mg/dl, of LDL-cholesterol \geq 100 mg/dl, nuchter gemeten tijdens minstens twee afnames met 1 tot 8 weken tussentijd, in een stabiele toestand, onder een aangepast dieet), voor zover deze zich in minstens één van de twee volgende risicosituaties bevinden:

2.1. Antecedent van minstens een arteriële aandoening, grondig gedocumenteerd door een bijkomend technisch onderzoek in het medisch dossier dat door de voorschrijver voor deze patiënt wordt bijgehouden:

- 2.1.1. ofwel coronair : infarctus, geobjectiveerde angor, acuut coronair syndroom, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie;
- 2.1.2. ofwel cerebraal : cerebrovasculair thrombotisch accident, gedocumenteerd transitair ischemisch accident;
- 2.1.3. ofwel perifeer: gedocumenteerd claudicatio intermittens.

2.2. Type 2 diabetes indien de patiënt ouder is dan 40 jaar ; Type 1 diabetes indien microalbuminurie aanwezig is.

De vergoeding in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie is toegestaan voor zover de behandeling een van de drie volgende situaties beoogt:

1. Ofwel intolerantie of contra-indicaties voor statines;
2. Ofwel een triglyceridenspiegel hoger dan 190 mg/dl;
3. Ofwel een HDL cholesterol lager dan 40 mg/dl.

3. Behandeling in bi-therapie

Fibrates (ATC C10AB):

1° recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de «evidence-based medicine», comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée :

a) Les spécialités mentionnées au point c) font l'objet d'un remboursement en catégorie B, pour autant qu'elles soient administrées chez des bénéficiaires pour :

1. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total \geq 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol \geq 115 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans la situation à risque suivante:

Le calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel donne actuellement (ou a, ou aurait donné (*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme

(* dans le cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque.

Le remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. soit intolérance ou contre-indications aux statines
2. soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

2. le traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire (définie par la présence d'un cholestérol sérique total \geq 175 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol \geq 100 mg/dl, mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) pour autant qu'ils se trouvent dans au moins une des deux situations à risque suivantes

2.1. Antécédent d'au moins une atteinte artérielle, dûment documentée par un examen technique complémentaire dans le dossier médical tenu par le prescripteur pour le patient concerné :

- 2.1.1. soit coronaire : infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire ;
- 2.1.2. soit cérébrale: accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté ;
- 2.1.3. soit périphérique : claudication intermittente documentée.

2.2. Diabète type 2 si le patient est âgé de plus de 40 ans ; Diabète type 1 si présence de microalbuminurie

Le remboursement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire est autorisé pour autant que le traitement vise une des trois situations suivantes :

1. Soit intolérance ou contre-indications aux statines ;
2. Soit taux de triglycérides sériques supérieur à 190 mg/dl ;
3. Soit cholestérol HDL inférieur à 40 mg/dl.

3. Traitement en bi-thérapie

3.1. Hetzij het fibraat wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling met een statine, voor zover de voorafgaande toediening van deze statine terugbetaald was aan de patiënt in categorie B conform aan de voorwaarden in de paragraaf met betrekking tot dit statine en als het triglyceridegehalte van de patiënt hoger blijft dan 190 mg/dl ondanks een behandeling van tenminste 3 maanden met dit statine, gebruikt in monotherapie aan de maximaal getolereerde dosis toegelaten voor terugbetaling.

3.2. Hetzij het gaat om de situatie waarbij acipimox wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling van tenminste 3 maanden met een fibraat, van toepassing in punt a) 3.2. van de paragraaf met betrekking tot acipimox in het hoofdstuk IV van het KB van 21.12.2001.

In het geval van een bi-therapie beschikt de voorschrijvende arts, in het medisch dossier dat hij bijhoudt voor deze patiënt, over een voorafgaand advies van een geneesheer-specialist in de interne geneeskunde, in de cardiologie of in de pediatrie (als de patiënt jonger is dan 18 jaar) die de noodzaak van deze bi-therapie bevestigt.

4. Beperking van het risico op acute pancreatitis bij de rechthebbenden die een ernstige hypertriglyceridemie vertonen, gedefinieerd door een triglyceridegehalte dat hoger blijft dan de 400 mg/dl ondanks adequate hygiëne-dietische maatregelen.

b) Bovendien moet het voorschrift dat aanleiding geeft tot vergoeding opgesteld zijn, conform aan volgende voorwaarden:

1. de voorschrijvend arts houdt rekening met een vergoedbare maximale dosering die beperkt is tot de dagelijkse maximumdosis die in de officiële bijsluiter is bepaald;
2. de voorschrijvend arts gaat de impact van de behandeling na door jaarlijks een lipidenprofiel uit te voeren, waarvan melding wordt gemaakt in het medisch dossier dat voor deze patiënt wordt bijgehouden ;
3. de voorschrijvend arts houdt rekening met de niet vergoeding van een specialiteit voorkomend onder punt c), tegelijk met een ander hypolipemierend geneesmiddel (statine, fibraat, resinaat, of een nicotinezuurderivaat), behalve indien aan de voorwaarden voor de bedoelde associatie, zoals ze voorkomend in de reglementering van het andere hypolipemierend geneesmiddel, is voldaan.

c) Overgangsmaatregelen:

Ten titel van overgangsmaatregel kunnen attesten waarvan het model is vastgelegd onder "d" van bijlage III van het huidige besluit, en die afgeleverd zijn voor het in voege treden van de huidige reglementering voor specialiteiten die in deze paragraaf vermeld zijn, hun geldigheid bewaren binnen hun vergoedings-categorie tot de uiterste datum van de toegestane periode, vermeld op deze machtigingen.

2° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken teneinde de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de adviserend geneesheren van de verzekeringsinstelling in staat te stellen na te gaan of de afgeleverde farmaceutische specialiteiten die aanleiding hebben gegeven tot vergoeding door de zorgverlener werden voorgeschreven overeenkomstig de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden:

Criterium dat voorkomt in de aanbevelingen:

1 . Primaire hypercholesterolemie (*)

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /
- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemierend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden aangenomen dat de voorwaarde voor het

3.1. Soit le fibraté est ajouté à un traitement préalable avec une statine, lorsque l'administration préalable de cette statine a été remboursée au patient en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine et que le taux de triglycérides du patient reste supérieur à 190 mg/dl malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à dose maximale tolérée remboursable.

3.2. Soit il s'agit de la situation où de l'acipimox est ajouté à un traitement préalable d'au moins 3 mois par fibraté, en application du point a) 3.2. du paragraphe relatif à l'acipimox dans le chapitre IV de l'AR du 21.12.2001.

Dans tous les cas de bi-thérapie, le médecin prescripteur dispose, dans le dossier médical tenu pour ce patient, d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si le patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie.

4. Réduction du risque de pancréatite aiguë chez des bénéficiaires qui présentent une hypertriglyceridémie sévère, définie par un taux de triglycérides restant supérieur à 400 mg/dl malgré des mesures hygiéno-diététiques adéquates.

b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :

1. le médecin prescripteur tient compte d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle ;
2. le médecin prescripteur vérifie l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical tenu pour ce patient ;
3. le médecin prescripteur tient compte du non remboursement d'une spécialité figurant au point c) simultanément avec celui d'une autre spécialité hypolipémiante (statine, fibraté, résine, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf lorsque les conditions relatives à l'association visée, telles qu'elles figurent dans la réglementation de l'autre hypolipémiant concerné, sont remplies.

c) Mesures transitoires :

A titre transitoire, les autorisations dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté, et qui ont été délivrées pour la spécialité figurant dans le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, peuvent conserver leur validité dans leur catégorie de remboursement jusqu'à la date limite de la période autorisée mentionnée sur ces autorisations.

2° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies :

Critère figurant dans les recommandations :

1 .Hypercholestérolémie primaire (*)

- Eléments à conserver dans le dossier : /
- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut considérer que la condition relative à l'établissement du diagnostic de

stellen van de diagnose van primaire hypercholesterolemie is vervuld op grond van de vergoeding die is toegekend in het raam van de oude bepalingen.

2. Aanwezigheid van een totaal serumcholesterol ≥ 190 mg/dl, of van een LDL-cholesterol ≥ 115 mg/dl (respectievelijk 175 mg/dl en 100 mg/dl in geval van antecedent van minstens één arteriële aandoening of van diabetes – cf punten 1.2.1 en 1.2.2), in een nuchtere toestand en ten minste tweemaal gemeten, met een tussentijd van 1 tot 8 weken (*), in een stabiele toestand en met een aangepast dieet

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

(Gedateerde) protocollen van de twee biologische testen door laboratoria voor klinische biologie.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemierend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, wordt de voorwaarde betreffende de tussentijd van 1 tot 8 weken tussen de twee bloedonderzoeken als vervuld beschouwd op grond van de naleving van de periode «van minstens 3 maanden» die in de oude bepalingen was vastgesteld.

3. Berekening (*) van het individueel absoluut cardiovasculair risico

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard: /

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die al op 30 november 2003 sedert minstens 3 jaar een vergoeding hadden gekregen voor een statine ter behandeling van hypercholesterolemie, en welke op die datum ten minste 75 jaar oud waren en geen enkele gedocumenteerde arteriële aandoening vertoonden, moet het globaal cardiovasculair risico niet worden berekend opdat zij de vergoeding van het voorschrift voor een fibraat kunnen blijven genieten.

3.1. $\geq 5\%$ op 10 jaar (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) rekening houdende met de leeftijd, het geslacht,

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van het berekeningsresultaat en van de verschillende elementen die voor de vaststelling ervan in aanmerking zijn genomen, alsook vermelding van de datum of het tijdvak (*) waarop die berekening betrekking heeft

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) De verschillende metingen die bij de berekening in aanmerking worden genomen, moeten binnen een zelfde tijdvak van maximaal 30 dagen zijn verricht.

3.2. Het serumcholesterol-gehalte (*),

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Als het om een andere biologische test gaat dan die vermeld in punt 1.1.: (Gedateerd) protocol van een laboratorium voor klinische biologie.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Voor de rechthebbenden die vóór 1 december 2003 al een vergoeding hadden gekregen voor een hypolipemierend geneesmiddel ter behandeling van hypercholesterolemie, en wanneer de voorschrijvend arts niet meer over de oude biologische protocollen zou beschikken, mag worden uitgegaan van een totale cholesterolwaarde van 250mg/dl voor het uitvoeren van de berekening.

3.3. De arteriële systolische druk

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

d'hypercholestérolémie primaire est remplie sur base de l'existence du remboursement accordé dans le cadre des anciennes dispositions.

2. Présence d'un cholestérol sérique total ≥ 190 mg/dl, ou d'un LDL-cholestérol ≥ 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète – cfr points 1.2.1 et 1.2.2), mesurés à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines (*) d'intervalle, en état stable, sous régime approprié

- Eléments à conserver dans le dossier :

Protocoles (datés) des deux biologiques, émanant de laboratoires de biologie clinique.

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, la condition relative à l'intervalle de 1 à 8 semaines entre les deux examens sanguins est considérée comme remplie sur base du respect de la période "d'au moins 3 mois" qui était fixée dans les anciennes dispositions.

3. Calcul (*) du risque cardiovasculaire absolu indivi-duel

- Eléments à conserver dans le dossier: /

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'une statine depuis au moins 3 ans en date du 30 novembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et qui, à cette date, étaient âgés d'au moins 75 ans sans avoir présenté aucune atteinte artérielle documentée, il n'est pas nécessaire de réaliser chez eux un calcul du risque cardiovasculaire global pour que la prescription d'un fibrate puisse continuer à leur être remboursée.

3.1. $\geq 5\%$ à 10 ans ((Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172)) en tenant compte de l'âge, du sexe

- Eléments à conserver dans le dossier :

Mention du résultat du calcul et des différents éléments qui ont été pris en compte pour son établissement, ainsi que mention de la date, ou de la période (*), à laquelle se rapporte ce calcul

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Les différentes mesures prises en compte dans le calcul doivent avoir été effectuées pendant une même période ne dépassant pas 30 jours.

3.2. Du taux de cholestérol sérique (*),

- Eléments à conserver dans le dossier :

S'il s'agit d'une biologie autre que celles figurant au point 1.1. : Protocole (daté) émanant d'un laboratoire de biologie clinique.

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Pour les bénéficiaires qui avaient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholestérolémie, et dans le cas où le médecin prescripteur ne disposerait plus des anciens protocoles biologiques, on peut utiliser une valeur présumée de cholestérol total de 250mg/dl pour effectuer le calcul.

3.3. De la pression artérielle systolique

- Eléments à conserver dans le dossier :

Vermelding van de (gedateerde) effectief gemeten waarde (*) en van de eventuele behandeling met antihypertensiva.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) Indien de effectief gemeten waarde genormaliseerd is ten gevolge van een behandeling met anti-hypertensiva, mag voor de berekening worden uitgegaan van een waarde van 160/90 mm Hg.

3.4. Tabaksgebruik

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van de aard, de ernst (*) en het aantal jaren tabaksgebruik,

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties:

(*) aantal sigaretten, of pakjes of hoeveelheid tabak, enz.

4. Diabetes mellitus

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Vermelding van het type diabetes, het aantal jaren dat men aan diabetes lijdt, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

Vermelding van de aanwezigheid van microalbuminurie indien type 1 diabetes, met bevestiging van de diagnose door een of meer afdoende biologische testen en/of een of meer medische protocollen.

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

5. Intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Elementen die in het dossier moeten worden bewaard:

Beschrijving en documentatie van de nevenwerkingen en/of andere elementen die aanleiding gegeven hebben tot de diagnose van intolerantie of contra-indicatie voor statines

- Opmerkingen en/of bijzondere situaties: /

3° de elementen waarover de zorgverlener moet beschikken indien de behandeling door een andere zorgverlener werd gestart:

Attest, verslag of protocol van een andere geneesheer die bevestigt dat hij in zijn eigen dossier over de elementen beschikt die nodig zijn om aan te tonen dat het voorschrift van een fibraat vermeld in punt 1°, c) van deze paragraaf bij de betrokken patiënt overeenstemt met de aanbevelingen in punt 1° en met de voorwaarden in punt 2° van die paragraaf. Dit document is niet nodig wanneer het gaat om een voorschrift dat voor een in een ziekenhuis opgenomen patiënt afgeleverd is door een ziekenhuisapotheek met het oog op de voortzetting van een lopende ambulante behandeling in het ziekenhuis; in dat geval vermeldt de voorschrijver dat in het dossier.

4° de maximale geldigheidsperiode waarna de in 2° en 3° bedoelde elementen hernieuwd moeten worden:

Die elementen moeten niet worden hernieuwd, maar kunnen eventueel worden aangevuld met andere elementen die bevestigen dat de aanbevelingen zijn nageleefd.

Mention de la valeur (datée) effectivement mesurée (*) et du traitement anti-hypertensif éventuel.

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) Si la valeur effectivement mesurée est normalisée du fait de l'existence d'un traitement anti-hypertensif, on peut utiliser une valeur présumée de 160/90 mm Hg pour effectuer le calcul.

3.4. Du tabagisme

- Éléments à conserver dans le dossier :

Mention de la nature du tabagisme, de son intensité (*), et de son ancienneté

- Remarques et/ou situations particulières :

(*) nombre de cigarettes, ou de paquets, ou quantité de tabac, etc.

4. Diabète sucré

- Éléments à conserver dans le dossier :

Mention du type de diabète et de son ancienneté, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologies démonstratives, et/ou par un ou des protocoles médicaux.

Mention de la présence de microalbuminurie pour le diabète de type 1, avec confirmation du diagnostic par une ou des biologies démonstratives, et/ou par un ou des protocoles médicaux.

- Remarques et/ou situations particulières : /

5. Intolérance ou contre-indications aux statines

- Éléments à conserver dans le dossier :

Description et documentation des effets secondaires, donnant lieu à une diagnose d'intolérance ou contre-indications aux statines

- Remarques et/ou situations particulières : /

3° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer si un autre dispensateur de soins a entamé le traitement :

Attestation, rapport, ou protocole d'un autre médecin qui confirme qu'il dispose dans son propre dossier des éléments nécessaires pour démontrer que la prescription d'une fibrate figurant au point 1°, c) du présent § chez le patient concerné est conforme aux recommandations figurant au point 1° et aux conditions figurant au point 2° de ce §. Ce document n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une prescription faisant l'objet d'une délivrance par une officine hospitalière pour un patient hospitalisé en vue de poursuivre à l'hôpital un traitement ambulatoire en cours, et, dans ce cas, le prescripteur en fait mention dans le dossier.

4° La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés aux points 2° et 3° doivent être renouvelés :

Ces éléments ne doivent pas être renouvelés, mais peuvent, le cas échéant, être complétés par d'autres éléments confirmant le respect des recommandations.

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |

| CEDUR | | AUROBINDO NV | | | ATC: C10AB02 | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 1132-901 1132-901 | 60 omhulde tabletten, 200 mg | 60 comprimés enrobés, 200 mg | | 11,33 4,56 | 11,33 4,56 | 1,21 | 2,02 |
| B-39 * | 0741-926 | 1 omhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé enrobé, 200 mg | | 0,0980 | 0,0980 | | |
| B-39 ** | 0741-926 | 1 omhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé enrobé, 200 mg | | 0,0805 | 0,0805 | | |
| B-39 *** | 0741-926 | 1 omhulde tablet, 200 mg | 1 comprimé enrobé, 200 mg | | 0,0995 | 0,0995 | 0,0202 | 0,0337 |

| EULITOP | | AUROBINDO NV | | | ATC: C10AB02 | | | |
|----------|-----------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 1158-658 1158-658 | 30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg | 30 comprimés à libération prolongée, 400 mg | | 11,34 4,57 | 11,34 4,57 | 1,21 | 2,02 |
| B-39 * | 0743-591 | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | | 0,1967 | 0,1967 | | |
| B-39 ** | 0743-591 | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | | 0,1613 | 0,1613 | | |
| B-39 *** | 0743-591 | 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg | 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg | | 0,1993 | 0,1993 | 0,0403 | 0,0673 |

| FENOFIBRAAT EG 200 mg | | EUROGENERICS | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 2060-838 2060-838 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | G | 14,35 6,88 | 14,35 6,88 | 1,82 | 3,04 |
| B-39 * | 0773-028 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | G | 0,0987 | 0,0987 | | |
| B-39 ** | 0773-028 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | G | 0,0810 | 0,0810 | | |
| B-39 *** | 0773-028 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | G | 0,0999 | 0,0999 | 0,0202 | 0,0338 |

| FENOFIBRATE AB 145 mg | | AUROBINDO NV | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 4654-026 4654-026 | 30 filmomhulde tabletten, 145 mg | 30 comprimés pelliculés, 145 mg | G | 11,90 5,00 | 11,90 5,00 | 1,33 | 2,21 |
| B-39 * | 7737-745 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | G | 0,2150 | 0,2150 | | |
| B-39 ** | 7737-745 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | G | 0,1767 | 0,1767 | | |
| B-39 *** | 7737-745 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | G | 0,2180 | 0,2180 | 0,0443 | 0,0737 |

| FENOGAL 200 mg LIDOSE | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 1416-411 1416-411 | 30 capsules, hard, 200 mg | 30 gélules, 200 mg | R | 8,75 2,58 | 8,75 2,58 | 0,68 | 1,14 |
| B-39 | 1447-796 1447-796 | 98 capsules, hard, 200 mg | 98 gélules, 200 mg | R | 13,71 6,38 | 13,71 6,38 | 1,69 | 2,82 |
| B-39 * | 0760-579 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | R | 0,0840 | 0,0840 | | |
| B-39 ** | 0760-579 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | R | 0,0690 | 0,0690 | | |
| B-39 *** | 0760-579 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | R | 0,0851 | 0,0851 | 0,0172 | 0,0288 |

| FENOGAL 267 mg LIDOSE | | LABORATOIRES SMB | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| B-39 | 2210-946 2210-946 | 30 capsules, hard, 267 mg | 30 gélules, 267 mg | G | 9,54 3,19 | 9,54 3,19 | 0,85 | 1,41 |
| B-39 | 2211-209 2211-209 | 90 capsules, hard, 267 mg | 90 gélules, 267 mg | G | 17,94 9,61 | 17,94 9,61 | 2,55 | 4,25 |
| B-39 * | 0779-934 | 1 capsule, hard, 267 mg | 1 gélule, 267 mg | G | 0,1378 | 0,1378 | | |
| B-39 ** | 0779-934 | 1 capsule, hard, 267 mg | 1 gélule, 267 mg | G | 0,1132 | 0,1132 | | |
| B-39 *** | 0779-934 | 1 capsule, hard, 267 mg | 1 gélule, 267 mg | G | 0,1397 | 0,1397 | 0,0283 | 0,0472 |

| FENOSUP LIDOSE 160 mg | | LABORATOIRES SMB | | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
| B-39 | 2451-979 2451-979 | 60 capsules, hard, 160 mg | 60 gélules, 160 mg | G | 14,11 6,69 | 14,11 6,69 | 1,77 | 2,96 | |
| B-39 * | 0787-515 | 1 capsule, hard, 160 mg | 1 gélule, 160 mg | G | 0,1438 | 0,1438 | | | |
| B-39 ** | 0787-515 | 1 capsule, hard, 160 mg | 1 gélule, 160 mg | G | 0,1182 | 0,1182 | | | |
| B-39 *** | 0787-515 | 1 capsule, hard, 160 mg | 1 gélule, 160 mg | G | 0,1458 | 0,1458 | 0,0295 | 0,0493 | |

| HYPERLIPEN 100 mg | | SANOFI BELGIUM | | | | ATC: C10AB08 | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
| B-39 | 0226-464 0226-464 | 30 capsules, hard, 100 mg | 30 gélules, 100 mg | R | 10,23 3,72 | 10,23 3,72 | 0,99 | 1,64 | |
| B-39 * | 0736-629 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 0,1600 | 0,1600 | | | |
| B-39 ** | 0736-629 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 0,1313 | 0,1313 | | | |
| B-39 *** | 0736-629 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 0,1622 | 0,1622 | 0,0330 | 0,0547 | |

| LIPANTHYL 67 MICRONISED | | VIATRIS | | | | ATC: C10AB05 | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
| B-39 | 1440-585 1440-585 | 90 capsules, hard, 67 mg | 90 gélules, 67 mg | R | 11,32 4,55 | 11,32 4,55 | 1,21 | 2,01 | |
| B-39 * | 0766-808 | 1 capsule, hard, 67 mg | 1 gélule, 67 mg | R | 0,0652 | 0,0652 | | | |
| B-39 ** | 0766-808 | 1 capsule, hard, 67 mg | 1 gélule, 67 mg | R | 0,0536 | 0,0536 | | | |
| B-39 *** | 0766-808 | 1 capsule, hard, 67 mg | 1 gélule, 67 mg | R | 0,0662 | 0,0662 | 0,0134 | 0,0223 | |

| LIPANTHYLNANO 145 mg | | VIATRIS | | | | ATC: C10AB05 | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| B-39 | 2388-700 2388-700 | 30 filmomhulde tabletten, 145 mg | 30 comprimés pelliculés, 145 mg | R | 11,94 5,03 | 11,94 5,03 | 1,33 | 2,22 | |
| B-39 | 2388-692 2388-692 | 90 filmomhulde tabletten, 145 mg | 90 comprimés pelliculés, 145 mg | R | 20,91 11,89 | 20,91 11,89 | 3,15 | 5,26 | |
| B-39 * | 0785-568 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | R | 0,1704 | 0,1704 | | | |
| B-39 ** | 0785-568 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | R | 0,1400 | 0,1400 | | | |
| B-39 *** | 0785-568 | 1 filmomhulde tablet, 145 mg | 1 comprimé pelliculé, 145 mg | R | 0,1728 | 0,1728 | 0,0350 | 0,0584 | |

Paragraaf 50000

§ 50000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 50100

§ 50100 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50200

§ 50200 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50300

§ 50300 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50400

§ 50400 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraphe 50000

§ 50000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 50100

§ 50100 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50200

§ 50200 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50300

§ 50300 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50400

§ 50400 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraaf 50500

§ 50500 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50600

§ 50600 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50700

§ 50700 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50800

§ 50800 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 50900

§ 50900 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 51000

§ 51000 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60000

§ 60000 is geschrapt op 01/06/2020.

Paragraaf 60100

§ 60100 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60200

§ 60200 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60300

§ 60300 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60400

§ 60400 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60600

§ 60600 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60700

§ 60700 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraphe 50500

§ 50500 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50600

§ 50600 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50700

§ 50700 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50800

§ 50800 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 50900

§ 50900 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 51000

§ 51000 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60000

§ 60000 est supprimé au 01/06/2020.

Paragraphe 60100

§ 60100 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60200

§ 60200 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60300

§ 60300 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60400

§ 60400 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60600

§ 60600 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60700

§ 60700 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraaf 60800

§ 60800 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraaf 60900

§ 60900 is geschrapt op 01/04/2020.

Paragraphe 60800

§ 60800 est supprimé au 01/04/2020.

Paragraphe 60900

§ 60900 est supprimé au 01/04/2020.