| Liste des besoins médicaux non rencontrés 2023 | Indicateur de priorité |
|---|------------------------|
| Glioblastome nouvellement diagnostiqué | 11,40 |
| Sclérose Latérale Amyotrophique | 11,34 |
| Maladie aigue du greffon contre l'hôte | 11,25 |
| Glioblastome récurrent | 10,58 |
| Déficit en sphingomyélinase acide | 10,54 |
| Leucodystrophie métachromatique | 10,40 |
| Céroïde-lipofuscinose neuronale de type 2 (CLN2) | 10,40 |
| Amylose à chaîne légère (AL) | 10,14 |
| Myopathie de Duchenne | 10,02 |
| Cancer de l'estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne HER2-positif, localement avancé, après progression malgré trastuzumab | 9,96 |
| Cholestase due à une atrésie biliaire (BA) | 9,93 |
| Débridement sélectif et précoce des brûlures profondes chez les enfants | 9,86 |
| Carcinome épidermoïde avancé du canal anal, localement avancé ou métastatique, après | |
| progression | 9,84 |
| Maladie lymphoproliférative prétraitée post-transplantation positive au virus d'Epstein barr (EBV-PTLD) | 9,50 |
| Traitement de ≥3 ligne du cancer du sein métastatique HER2-positif (HER2+ mBC) après échec du trastuzumab emtansin (T-DM1) | 9,37 |
| Liposarcome dédifférencié avancé | 9,35 |
| Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) | 9,28 |
| Cancer du sein avancé (stade IV) HR-positif HER2-négatif avec mutation PIK3CA | 9,2 |
| Maladie chronique du greffon contre l'hôte | 9,2 |
| Adénocarcinome localement avancé non résécable ou métastatique de l'estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne exprimant des marqueurs biologiques pouvant être ciblés | 9,15 |
| Carcinome rénal papillaire non résécable, localement avancé ou métastasé MET-déterminé | 9,09 |
| Alfa-Mannosidose | 9,06 |
| Neurofibromatose type 1 (NF1) | 8,94 |
| Lymphome folliculaire (LF) récurrent ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs (3L+) | 8,83 |
| Paralysie supranucléaire progressive (PSP) | 8,8 |
| Cancer Bronchique à Petites Cellules (SCLC) | 8,8 |
| Maladie de Huntington | 8,78 |
| Maladie de Huntington Maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) | 8,75 |
| Lymphome diffus à grandes cellules B non GCB | 8,74 |
| Sclérodermie systémique et maladie pulmonaire interstitielle (fibrose pulmonaire) | • |
| Ostéogenèse imparfaite | 8,6 8,52 |
| Pneumonie chez des patients intubés et ventilés mécaniquement | · |
| β-thalassémie dépendante des transfusions | 8,51 |
| | 8,5 |
| Syndrome d'Alagille (ALGS) avec prurit et/ou cholestase | 8,48 |
| Cancer urothélial métastasé de la vessie (1L) | 8,37 |
| Cancer du poumon non à petites cellules | 8,32 |
| Receveurs de transplantation atteints d'infections à cytomégalovirus (CMV) réfractaires ou résistantes | 8,28 |
| Syndrome d'hypercroissance associé à une mutation de PIK3CA (PROS) | 8,23 |
| Cancer colorectal métastasé | 8,03 |
| Carcinome épidermoïde cutané avancé | 8,0 |
| Mastocytose systémique agressive (ASM) | 8,0 |
| C3-Glomerulopathie (C3G) | 7,83 |
| drépanocytose | 7,8 |
| Syndrome carcinoïde insuffisamment contrôlé | 7,77 |
| Glomérulosclérose segmentaire et focale | 7,73 |
| Déficit en lipase acide lysosomale | 7,62 |
| Syndrome de Cushing endogène | 7,6 |

| Cancer du sein métastatique (mBC) avec faible expression du récepteur HER2 (HER2-low), après échec d'au moins 1 ligne de chimiothérapie antérieure | 7,58 |
|--|------|
| Lupus néphrétique | 7,52 |
| Psoriasis pustuleux généralisé (psoriasis pustulosa generalisata) | 7,52 |
| Carcinome cellulaire rénal avancé (RCC) L2 | 7,33 |
| Infections au virus respiratoire syncytial (RSV) chez les enfants | 7,28 |
| Myosite sporadique à inclusions (sIBM) | 7,22 |
| Myélofibrose | 7,18 |
| Syndrome d'hyperchylomicronémie familiale | 7,12 |
| Vascularite associée aux auto-anticorps cytoplasmiques anti-neutrophiles (ANCA) | 6,98 |
| Purpura thrombotique thrombocytopénique | 6,87 |
| Alzheimer | 6,78 |
| tumeur à cellules géantes des tissus mous | 6,57 |
| Néphropathie à IgA | 6,48 |
| Virus respiratoire syncytial | 6,45 |
| Œsophagite à éosinophiles | 6,43 |
| Traitement d'urgence d'une overdose suspectée ou connue aux opioïdes | 6,18 |
| Cholangite biliaire primitive (CBP) avec cholestase insuffisamment contrôlée ou intolérante à l'acide ursodésoxycholique (UDCA) | 6,10 |